

Je veux arrêter le préservatif avec mon ou ma partenaire

J'ai eu un rapport sexuel non protégé

J'ai un doute

**J'ai le droit de réaliser un test gratuit
de dépistage des infections
sexuellement transmissibles (IST)**



Où faire un test près de chez vous ?

En Centre de Santé Sexuelle (CSS)

Pour tous·tes sans ordonnance

 **Clermont l'Hérault**

Place Jean Jaurès

 04 67 67 52 01

 **Gignac**

4 Parc d'activité de Camalcé

 04 67 67 52 01

 **Lodève**

1 AV. du Dr Joseph Maury

 04 67 67 52 01

 **Pézenas**

22 rue Henri Reboul

 06 40 82 77 83

En laboratoire d'analyses médicales

Pour tous·tes sans ordonnance, à l'exception des personnes majeures sans protection sociale et des personnes mineures souhaitant bénéficier de l'anonymat

 **Canet, Clermont l'Hérault, Gignac,
Lodève, Pézenas**

En cabinet libéral de sage-femme, de gynécologue ou de médecin généraliste

Trouvez des coordonnées sur sante.fr :



Le saviez vous ?

Il est possible de bénéficier d'un accompagnement dans la démarche de dépistage : délivrance d'une ordonnance, conseil et suivi auprès d'une sage-femme, d'un médecin généraliste ou médecin gynécologue.

Où faire un test ailleurs ?


En Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)

Retrouvez les coordonnées des CeGIDD sur vih.org



En Centre de Santé Sexuelle (CSS)

Retrouvez les coordonnées des CSS sur sante.fr



Test Rapide d'Orientation Diagnostique (TROD) pour le V.I.H. (sida) et les hépatites B et C



Montpellier

AIDES - Le Spot : 16 boulevard d'Orient

CAARUD Axess : 66 avenue Charles Flahault

CAARUD Réduire les risques : 5 rue Fouques



Sète

VIVRE : 53 bd Chevalier de Clerville



Béziers

CAARUD Axess : 54 Av. Clémenceau



5 choses à savoir

- 1 Les IST sont des maladies qui se transmettent par le **contact avec le sexe** d'une personne qui a une IST (homme ou femme). La transmission peut se faire sans qu'il y ait pénétration.
- 2 Il est possible d'être porteur d'une IST sans se sentir malade ni avoir de symptômes : le dépistage est le **seul moyen de savoir**.
- 3 Une IST diagnostiquée tôt permet **d'éviter que l'infection s'aggrave** et entraîne des séquelles ou des complications.
- 4 Les **modes de dépistage** dépendent des IST recherchées. Il peut s'agir d'une prise de sang, d'une analyse d'urine ou d'un examen clinique avec éventuellement un prélèvement local. Pour le VIH (sida) il existe un TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique) et un auto-test.
- 5 Il est possible de **se faire vacciner** contre l'hépatite B et le papillomavirus (HPV).

Retrouvez nos flyers **accès à la contraception** et à **l'IVG** sur notre espace numérique :



Pour plus d'informations :

questionsexualite.fr

www.sida-info-service.org

www.ameli.fr

<https://santebd.org>

onsexprime.fr

0 800 08 11 11 (gratuit et anonyme)